

ИНСТРУКЦИЯ

по применению КреАМИНО® для производства премиксов, комбикормов с целью повышения интенсивности роста и сохранности свиней и сельскохозяйственной птицы

(организация-производитель «AlzChem Trostberg GmbH» / «АльцХем Тростберг ГмбХ», Германия)

I. Общие сведения

1. КреАМИНО® (CreAMINO®) – кормовая добавка для производства премиксов, комбикормов с целью повышения интенсивности роста и сохранности свиней и сельскохозяйственной птицы.

2. КреАМИНО® содержит основное действующее вещество гуанидинуксусную кислоту (N-(аминоиминометил)-глицин), полученную методом химического синтеза, не менее 96 %.

Не содержит генно-модифицированных продуктов.

Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых норм, принятых в Российской Федерации.

3. КреАМИНО® представляет собой микрогранулы белого цвета.

4. Выпускают расфасованным по 25 кг в трехслойные бумажные мешки с полиэтиленовой вставкой по 750 и 1000 кг в полимерные мешки из полипропилена и по 20 тонн в специально оборудованные контейнеры.

Каждую единицу фасовки маркируют на русском языке с указанием: названия кормовой добавки, названия и адреса организации-производителя, состава и гарантированных показателей, номера партии, даты производства, срока и условий хранения, массы нетто, назначения кормовой добавки, способа применения, знака соответствия, регистрационного номера, надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

Хранят в упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 5 °С до 30 °С при относительной влажности 40-75%.

Срок хранения – 2 года со дня изготовления.

КреАМИНО® не должен применяться по истечении срока хранения.

II. Биологические свойства

5. Гуанидинуксусная кислота является встречающейся у животных, а также человека аутогенной субстанцией, которая играет центральную роль при биосинтезе креатина. Рационы с недостаточным содержанием или без животного белка дефицитны по креатину. Для быстро растущих животных потребность в нем не может быть полностью удовлетворена за счет эндогенного синтеза. Достаточный уровень креатина поддерживает оптимальный метаболизм энергии, высокую продуктивность животных и характеристики туши.

КреАМИНО® практически полностью усваивается организмом, всасываясь в тонком отделе кишечника.

III. Порядок применения

7. КреАМИНО® применяют для производства премиксов, комбикормов с целью повышения интенсивности роста и сохранности свиней и сельскохозяйственной птицы.

8. КреАМИНО® вносят в комбикорма и премиксы на комбикормовых заводах или кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии смешивания.

Рекомендуемы нормы ввода:

- сельскохозяйственной птице (на протяжении всей фазы роста) – 600 г/т корма;
- пороссятам-отъемышам – 600-1200 г/т корма;
- лактирующим и супоросным свиноматкам – 500-1000 г/т корма;
- свиньи на откорме – 600-1200 г/т корма.

9. При применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией побочных явлений и осложнений не выявлено. Противопоказания не установлены.

10. КреАМИНО® совместим со всеми ингредиентами кормов, лекарственными средствами и другими кормовыми добавками.

11. Продукцию птицеводства и свиноводства после применения КреАМИНО® можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

12. При работе с кормовой добавкой следует соблюдать обычные правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные для работы с кормовыми добавками. Необходимо использовать средства индивидуальной защиты: спецодежду, спецобувь, респиратор, защитные очки. При перерыве в работе и по окончании работы следует вымыть руки и лицо водой. При попадании кормовой добавки в глаза следует немедленно промыть их большим количеством воды.

14. КреАМИНО® следует хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция по применению разработана ООО «Эвоник Химия», г. Москва, Россия, совместно с фирмой «Evonik Nutrition and Care GmbH» (Германия).

Адрес организации-производителя: AlzChem Trostberg GmbH, Dr.-Albert-Frank-Strasse 32, 83308 Trostberg (Германия).

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

При утверждении настоящей инструкции утрачивает силу инструкция, утвержденная Россельхознадзором 30.06.2017 г.

Регистрационный номер ПВИ-2-30.13/04125