

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению Локсидана 300 для предотвращения окисления жиров и жирорастворимых витаминов в комбикормах и кормовом сырье для сельскохозяйственных животных, в том числе птиц

(организация-производитель: компания «Kaesler Nutrition GmbH»/  
«Кеслер Нутришн ГмбХ», Германия)

### I. Общие сведения

1. Локсидан 300 (Loxidan 300) – добавка кормовая для предотвращения окисления жиров и жирорастворимых витаминов в комбикормах и кормовом сырье для сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.

2. Состоит из смеси действующих веществ: бутилгидроксианизола (ВНА) (12%), бутилгидрокситолуола (ВНТ) (12%), пропилгаллата (5%), лимонной кислоты (2%), а также вспомогательных компонентов: моно-полиэтиленгликоля-рицинолеата (20%), моно- и диглицеридов жирных кислот (15%), пропан-1,2-диола (20%) и рапсового масла (14%). Отклонения в содержании действующих веществ не должны превышать  $\pm 5\%$ .

Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.

3. По внешнему виду добавка представляет собой жидкость желтого цвета со специфическим запахом, смешивается с водой в любых соотношениях.

4. Выпускают расфасованной по 25 кг в пластиковых канистрах, по 200 кг в пластиковых бочках и по 1000 кг в пластиковых контейнерах.

Каждую единицу фасовки маркируют с указанием на русском языке: названия организации-производителя, ее адреса и товарного знака, названия, назначения и способа применения добавки, состава и гарантируемых показателей, массы нетто, срока и условий хранения, даты изготовления, номера партии, информации о подтверждении соответствия, регистрационного номера, надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

Хранят в упаковке производителя в сухом, защищенном от света, хорошо вентилируемом месте при температуре от 5 °С до 25 °С.

Срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

Не допускать попадания добавки в канализацию, поверхностные и грунтовые воды.

Утилизировать остатки неиспользованной добавки и тару необходимо в соответствии с местным законодательством в пункте сбора вредных и специальных отходов.

Добавка не должна применяться по истечении срока хранения.

### II. Биологические свойства

5. Биологические свойства Локсидана 300 обусловлены способностью, входящих в его состав компонентов, предотвращать окисление жирорастворимых витаминов, каротиноидов и жиров растительного и животного происхождения в кормах и кормовом сырье.

6. Применение добавки увеличивает сроки хранения комбикормов, повышает переваримость и усвояемость корма. Обеспечивает высокие темпы роста и развития сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.

### III. Порядок применения

7. Локсидан 300 применяют для предотвращения окисления жиров и жирорастворимых витаминов в комбикормах и кормовом сырье для сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.

8. Добавку вводят в готовые корма или кормовое сырье на комбикормовых заводах или в кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии ввода жидких компонентов.

Нормы ввода добавки составляют:

- в комбикорма – 200–400 мг/кг;

- в кормовое сырье: жиры и растительные масла – 200–800 мг/кг.

9. Побочных явлений и осложнений при использовании кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено. Противопоказаний не установлено.

10. Локсидан 300 совместим со всеми ингредиентами комбикормов, лекарственными препаратами и другими кормовыми добавками.

11. Продукцию животноводства и птицеводства при применении Локсидана 300 можно использовать в пищевых целях без ограничений.

### IV. Меры личной профилактики

12. При работе с Локсиданом 300 следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. Необходимо использовать средства индивидуальной защиты: каучуковые или латексные перчатки, плотно прилегающие очки, защитную одежду. При недостаточной системе кондиционирования воздуха использовать респиратор.

13. При попадании добавки в глаза немедленно промыть большим количеством проточной воды. При попадании на кожу промыть водой с мылом. При вдыхании – вывести на свежий воздух. При проглатывании – промыть рот и выпить большое количество воды. При любом несчастном случае обратиться к врачу, при себе иметь настоящую инструкцию или тарную этикетку.

14. Запрещается использовать тару из-под добавки в бытовых целях.

15. Хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция разработана компанией «Kaesler Nutrition GmbH», Германия.

Наименование и адрес организации - производителя: «Kaesler Nutrition GmbH», Zeppelinstrasse 3, 27472 Cuxhaven, Germany.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Локсидана 300, утвержденная Россельхознадзором 12 апреля 2016 года

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Регистрационный номер ПВИ-2-12.14/04458